


ALGORITMO PERSONAS ASINTOMÁTICAS

EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL TEST

TEST IgM/IgG



TEST Ac Totales

Actualmente no está indicado el cribado poblacional

- **Profesionales:** Trabajadores de prisiones, cuerpos y fuerzas de seguridad, transporte, manipuladores de alimentos, establecimientos de alimentación, etc.
- **Personas vulnerables:** Pacientes que se trasladan en transporte sanitario colectivo (diálisis, oncología, etc.); con discapacidad, enfermedades raras, etc. y sus familiares; inmunodeprimidos; onco-hematológicos, previo a tratamiento quimioterápico y radioterápico.
- **Pacientes en otras situaciones:** Incluirlo en protocolo de Valoración Preoperatoria; previamente a la realización de estudios endoscópicos; embarazadas que requieran atención sanitaria por cualquier motivo.

Para Residentes y trabajadores de Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios, ver algoritmo de residencias.

Para Profesionales Sanitarios: ver algoritmo de profesionales sanitarios.

El test debe ser interpretado con prudencia dado que aún no está clara la cinética viral SARS 2

*Antecedentes de síntomas compatibles con infección por COVID-19 hace más de 14 días; si ha tenido síntomas en los últimos 14 días, ver algoritmo de sintomáticos

En personas con clínica compatible de más de 14 días, preferiblemente realizar test de AC totales. En personas asintomáticas, preferiblemente realizar test de IgG e Ig M.