

Es normal que te entren
ganas de hacerlo en la de tus padres

Lo que no es normal es que te entren
ganas de complicarte la vida

**Prevenir las Infecciones
de Transmisión Sexual está en tu mano**

#SiemprePreservativo



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Es normal que te entren
ganas de probar los asientos traseros

Lo que no es normal es que te entren
ganas de complicarte la vida

**Prevenir las Infecciones
de Transmisión Sexual está en tu mano**

#SiemprePreservativo



Es normal que te entren
ganas de montártelo en un festival

Lo que no es normal es que te entren
ganas de complicarte la vida

**Prevenir las Infecciones
de Transmisión Sexual está en tu mano**

#SiemprePreservativo




La mayoría de las **Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)** se transmiten de una persona a otra durante las **relaciones sexuales sin protección**, ya sean vaginales, anales u orales, o si se comparten juguetes sexuales.

La infección puede darse también por el **contacto de piel con piel** en el caso de que haya ulceraciones, o **piel-mucosa**.

Están causadas por **bacterias, virus, hongos o parásitos**.

Muchas de las ITS **pasan desapercibidas**, sobre todo al principio. La mayoría se **curan y se previenen de forma sencilla**, pero si no se tratan adecuadamente pueden tener **importantes consecuencias**.

Entre las **ITS** más frecuentes se encuentran:



Hay una serie de **síntomas** a los que hay que prestar atención porque pueden indicar que has contraído una ITS. **Pero ¡¡ recuerda que puedes tener ITS sin ningún síntoma !!**

EN LAS MUJERES

- Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable.
- Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.
- Dolor en la zona de la pelvis.
- escozor o picor alrededor de los genitales.
- Ardor al orinar o defecar.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
- Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual con penetración.
- Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, de aparición repentina.

EN LOS HOMBRES

- Secreción por la uretra.
- Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
- Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.
- escozor o picor alrededor de los genitales.
- Dolor o inflamación en los testículos.
- Ardor y dolor al orinar o defecar.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas acude a un **centro de salud o a un centro de ITS** para realizarte una revisión y seguir las prescripciones médicas.

Si tienes una ITS es conveniente que **avises a las personas con quienes hayas mantenido relaciones sexuales** recientes para informarles sobre la posibilidad de transmisión aunque no tengan síntomas.

Recuerda que la **mayoría de las ITS se curan bien si se tratan a tiempo.**



SÓLO EL PRESERVATIVO PROTEGE FRENTE A LA TRANSMISIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS

ÚSALO EN TUS RELACIONES SEXUALES